

Тест 24.1.

Пацієнт віком 16 років скаржиться на біль у великих суглобах, набряклість та почервоніння лівого колінного суглоба, підвищення температури тіла до 37,9 °С. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися 5 днів тому після перенесеного гострого фарингіту. Який найімовірніший діагноз?

Тест 24.2.

Пацієнт віком 16 років скаржиться на біль у великих суглобах, набряклість та почервоніння лівого колінного суглоба, підвищення температури тіла до 37,9 °С. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися 5 днів тому **після перенесеного гострого фарингіту**. Який найімовірніший діагноз?

Реактивний артрит

Подагра

Ревматичний артрит

Ревматоїдний артрит

Деформуючий артроз

Тест 24.3.

Реактивний артрит

Подагра

Ревматичний артрит

Ревматоїдний артрит

Деформуючий артроз

Тест 25.1.

У чоловіка 22 років з'явилися сильні болі в нижній частині спини, які іррадіюють у п'яткові кістки, внутрішню поверхню стегон, спостерігається підвищення температури до 38,2 °С. За три тижні відчув важкорухомість у хребті, болі в ілеосакральних суглобах. Рентгенологічно виявлено: розширення щілини ілеосакрального з'єднання, склерозування спінальних зв'язків. Про яке захворювання слід думати?

Тест 25.2.

У чоловіка **22 років** з'явилися сильні болі в нижній частині спини, які іррадіюють у п'яткові кістки, внутрішню поверхню стегон, спостерігається підвищення температури до 38,2 °С. За три тижні відчув важкорухомість у хребті, болі в **ілеосакральних суглобах**. Рентгенологічно виявлено: розширення щілини ілеосакрального з'єднання, **склерозування спінальних зв'язків**. Про яке захворювання слід думати?

Анкілозуючий спондилоартрит

Грижа спинального каналу

Оперізуєчий лишай

Міжреберна невралгія

Киста сакрального відділу хребта

Тест 25.3.

Анкілозуючий спондилоартрит

Грижа спинального каналу

Оперізуєчий лишай

Міжреберна невралгія

Киста сакрального відділу хребта

Тест 26.1.

Жінка 22 років із підозрою на системний червоний вовчак скаржиться на «летючий» біль у суглобах рук і ніг, підвищення температури до 38,5–39 °С упродовж 3 тижнів, задишку, серцебиття, слабкість. Об'єктивно встановлено: еритема на щоках та носі. У крові виявлено: Нь – 90 г/л, тромбоцити – 135×10^9 /л, ШОЕ – 43 мм/год. У сечі виявлено: білок – 2,66 г/л, еритроцитів – 8–10 в п/з. Виявлення яких антитіл у пацієнтки найбільш значиме для постановки діагнозу?

Тест 26.2.

Жінка 22 років із підозрою на **системний червоний вовчак** скаржиться на «летючий» біль у суглобах рук і ніг, підвищення температури до 38,5–39 °С упродовж 3 тижнів, задишку, серцебиття, слабкість. Об'єктивно встановлено: **еритема на щоках та носі**. У крові виявлено: Нь – 90 г/л, тромбоцити – 135×10^9 /л, ШОЕ – 43 мм/год. У сечі виявлено: білок – 2,66 г/л, еритроцитів – 8–10 в п/з. Виявлення яких антитіл у пацієнтки найбільш значиме для постановки діагнозу?

До 2-х спіральної нативної ДНК

Кріоглобуліни

До фосфоліпідів

Ревматоїдний фактор

До тромбоцитів

Тест 26.3.

До 2-х спіральної нативної ДНК

Кріоглобуліни

До фосфоліпідів

Ревматоїдний фактор

До тромбоцитів

Тест 27.1.

Жінка 56 років із надмірною масою тіла скаржиться на біль у колінних суглобах, який посилюється під час ходіння, особливо по східцях, під час довгого стояння на ногах. Хворіє 5 років. Об'єктивно встановлено: колінні суглоби деформовані, набряклі, підчас руху – болючі. Рентгенограма суглобів показала: суглобова щілина звужена, субхондральний склероз, краєві остеофіти. Який діагноз найбільш імовірний?

Тест 27.2.

Жінка **56 років** із надмірною масою тіла скаржиться на біль у колінних суглобах, який посилюється **під час ходіння**, особливо **по східцях**, під час довгого стояння на ногах. Хворіє 5 років. Об'єктивно встановлено: колінні суглоби деформовані, набряклі, підчас руху – болючі. Рентгенограма суглобів показала: суглобова щілина звужена, субхондральний склероз, **краєві остеофіти**. Який діагноз найбільш імовірний?

Остеоартроз

Подагра

Реактивний артрит

Ревматоїдний артрит

Ревматичний артрит

Тест 27.3.

Остеоартрит

Подагра

Реактивний артрит

Ревматоїдний артрит

Ревматичний артрит

Тест 28.1.

Дівчина 22 років, хвора на системний червоний вовчак, скаржиться на лихоманку, схуднення, біль у дрібних суглобах кистів. Об'єктивно встановлено: дифузна алопеція, генералізована лімфаденопатія, еритематозна висипка на щоках та спинці носа, ексудативний плеврит та перикардит. Температура тіла - 38,4 °С. У крові виявлено: лейкоцити – $3,1 \times 10^9/\text{л}$, НЬ – 102 г/л, ШОЕ – 56 мм/год, С-реактивний протеїн - (++++). Яка доза преднізолону є доцільною у цьому разі?

Тест 28.2.

Дівчина 22 років, хвора на системний червоний вовчак, скаржиться на лихоманку, схуднення, біль у дрібних суглобах кистів. Об'єктивно встановлено: дифузна алопеція, генералізована лімфаденопатія, еритематозна висипка на щоках та спинці носа, ексудативний плеврит та перикардит. Температура тіла - 38,4 °С. У крові виявлено: лейкоцити – $3,1 \times 10^9/\text{л}$, Нб – 102 г/л, ШОЕ – 56 мм/год, С-реактивний протеїн - (++++). Яка доза преднізолону є доцільною у цьому разі?

1 мг/кг

0,5 мг/кг

0,25 мг/кг

0,75 мг/кг

5,0 мг/кг

Тест 28.3.

1 мг/кг

0,5 мг/кг

0,25 мг/кг

0,75 мг/кг

5,0 мг/кг