

Невідкладні стани 10.03

Тест 1.1

Чоловік 56-ти років хворіє на ХОЗЛ упродовж 20-ти років. На висоті значного фізичного навантаження відчув зненацька різку змішану задишку, біль у грудній клітці справа, серцебиття. Об'єктивно: стан важкий, АТ – 100/70 мм рт. ст., ЧСС – 110/хв., ЧД – 28/хв., права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно: коробковий звук над правою легенею, аускультативно дихання різко ослаблене. **Який невідкладний стан у хворого?**

Тест 1.2

Чоловік 56-ти років хворіє на **ХОЗЛ** упродовж **20-ти років**. На **висоті значного фізичного навантаження** відчув зненацька **різку змішану задишку**, біль у грудній клітці справа, серцебиття.

Об'єктивно: стан важкий, АТ – 100/70 мм рт. ст., ЧСС – 110/хв., ЧД – 28/хв., права половина грудної клітки відстає в акті дихання.

Перкуторно: коробковий звук над правою легенею, аускультативно дихання різко ослаблене. Який невідкладний стан у хворого?

- А.Спонтанний пневмоторакс
- В.Інфаркт міокарда
- С.Негоспітальна пневмонія
- Д.Тромбоемболія легеневої артерії
- Е.Напад бронхіальної астми

Тест 1.3

Чоловік 56-ти років хворіє на **ХОЗЛ** упродовж **20-ти років**. На **висоті значного фізичного навантаження** відчув зненацька **різку змішану задишку**, біль у грудній клітці справа, серцебиття. Об'єктивно: стан важкий, АТ – 100/70 мм рт. ст., ЧСС – 110/хв., ЧД – 28/хв., права половина грудної клітки відстає в акті дихання. **Перкуторно: коробковий звук над правою легенею**, аускультативно дихання різко ослаблене. Який невідкладний стан у хворого?

А.Спонтанний пневмоторакс

В.Інфаркт міокарда

С.Негоспітальна пневмонія

Д.Тромбоемболія легеневої артерії

Е.Напад бронхіальної астми

Тест 2.1

У пацієнта раптово з'явився різкий біль у правій половині грудної клітки. Швидко наросла задишка. Об'єктивно спостерігається виражений акроціаноз. Стан пацієнта важкий. Визначається підшкірна емфізема в ділянці шиї і верхніх відділів грудної клітки. Над правою легенею прослуховується коробковий звук, дихання відсутнє. Межі серця зсунуті вліво. ЧСС – 110/хв., АТ – 100/60 мм рт. ст.

Яке захворювання найімовірніше у пацієнта?

Тест 2.2

У пацієнта **раптово** з'явився **різкий біль у правій половині грудної клітки**. **Швидко** **наросла задишка**. Об'єктивно спостерігається виражений акроціаноз. Стан пацієнта важкий. Визначається **підшкірна емфізема в ділянці шиї і верхніх відділів грудної клітки**. Над правою легенею прослуховується **коробковий звук, дихання відсутнє**. **Межі серця зсунуті вліво**. ЧСС – 110/хв., АТ – 100/60 мм рт. ст. Яке захворювання найімовірніше у пацієнта?

- А.Спонтанний пневмоторакс
- В.Позагоспітальна пневмонія
- С.Інфаркт легені
- Д.Ексудативний плеврит
- Е.Інфаркт міокарда

Тест 2.3

У пацієнта **раптово** з'явився **різкий біль у правій половині грудної клітки**. **Швидко** **наросла задишка**. Об'єктивно спостерігається виражений акроціаноз. Стан пацієнта важкий. Визначається **підшкірна емфізема в ділянці шиї і верхніх відділів грудної клітки**. Над правою легенею прослуховується **коробковий звук, дихання відсутнє**. **Межі серця зсунуті вліво**. ЧСС – 110/хв., АТ – 100/60 мм рт. ст. Яке захворювання найімовірніше у пацієнта?

- А.Спонтанний пневмоторакс**
- В.Позагоспітальна пневмонія
- С.Інфаркт легені
- Д.Ексудативний плеврит
- Е.Інфаркт міокарда

Тест 3.1

26-річна вагітна жінка доставлена до відділення невідкладної терапії на 36-му тижні вагітності зі скаргами на інтенсивний головний біль у лобній ділянці. При фізикальному обстеженні: артеріальний тиск – 170/90 мм рт. ст., пульс – 85/хв., частота дихання – 15/хв., температура – 36,9 оС, набряки кінцівок. Серцебиття плоду – 159/хв. Під час огляду у жінки розвивається напад генералізованих тоніко-клонічних судом. **Який препарат лікар має ввести першочергово?**

Тест 3.2

26-річна вагітна жінка доставлена до відділення невідкладної терапії на 36-му тижні вагітності зі скаргами на інтенсивний головний біль у лобній ділянці. При фізикальному обстеженні: **артеріальний тиск – 170/90 мм рт. ст.**, пульс – 85/хв., частота дихання – 15/хв., температура – 36,9 оС, **набряки кінцівок**. Серцебиття плоду – 159/хв. Під час огляду у жінки розвивається **напад генералізованих тоніко-клонічних судом**. Який препарат лікар має ввести першочергово?

- А.Магнію сульфат
- В.Ламотриджин
- С.Фенітоїн
- Д.Діазепам
- Е.Натрію вальпроат

Тест 3.3

26-річна вагітна жінка доставлена до відділення невідкладної терапії на 36-му тижні вагітності зі скаргами на інтенсивний головний біль у лобній ділянці. При фізикальному обстеженні: **артеріальний тиск – 170/90 мм рт. ст.**, пульс – 85/хв., частота дихання – 15/хв., температура – 36,9 °C, **набряки кінцівок**. Серцебиття плоду – 159/хв. Під час огляду у жінки розвивається **напад генералізованих тоніко-клонічних судом**. Який препарат лікар має ввести першочергово?

А.Магнію сульфат

В.Ламотриджин

С.Фенітоїн

Д.Діазепам

Е.Натрію вальпроат

Тест 4.1

Пацієнта віком 18 років шпиталізовано до лікарні після бійки з ознаками внутрішньої кровотечі. З анамнезу відомо, що хворіє на гемофілію А. Діагностовано позаочеревну гематому. **Що першочергово потрібно призначити пацієнту?**

Тест 4.2

Пацієнта віком **18 років** шпиталізовано до лікарні після бійки з ознаками внутрішньої кровотечі. З анамнезу відомо, що **хворіє на гемофілію А**. Діагностовано позаочеревну гематому. Що **першочергово** потрібно призначити пацієнту?

- А.Кріопреципітат
- В.Суху плазму
- С.Тромбоцитарну масу
- Д.Свіжу кров
- Е.Амінокапронову кислоту

Тест 4.3

Пацієнта віком **18 років** шпиталізовано до лікарні після бійки з ознаками внутрішньої кровотечі. З анамнезу відомо, що **хворіє на гемофілію А**. Діагностовано позаочеревну гематому. Що **першочергово** потрібно призначити пацієнту?

А.Кріопреципітат

В.Суху плазму

С.Тромбоцитарну масу

Д.Свіжу кров

Е.Амінокапронову кислоту

Тест 5.1

Чоловік 63-х років був госпіталізований 5 днів тому з приводу інфаркту міокарда. Раптом він поскаржився на сильний біль у грудях та втратив свідомість. Пульс не визначається, тони серця відсутні. ЕКГ: синусовий ритм, QS та підйом сегмента ST в V1–V4. Реанімаційні заходи неефективні. При пункції виявлена кров в порожнині перикарда. Вкажіть найбільш імовірне ускладнення:

Тест 5.2

Чоловік 63-х років був госпіталізований **5 днів тому** з приводу **інфаркту міокарда**. **Раптом** він поскаржився на **сильний біль у грудях та втратив свідомість**. **Пульс не визначається, тони серця відсутні**. ЕКГ: синусовий ритм, QS та підйом сегмента ST в V1–V4. Реанімаційні заходи неефективні. **При пункції виявлена кров в порожнині перикарда**. Вкажіть найбільш імовірне ускладнення:

- А.Порушення цілісності стінки лівого шлуночка
- В.Тромбоемболія легеневої артерії
- С.Гостра мітральна недостатність
- Д.Гострий перикардит
- Е.Порушення цілісності міжшлуночкової перегородки

Тест 5.3

Чоловік 63-х років був госпіталізований **5 днів тому** з приводу **інфаркту міокарда**. **Раптом** він поскаржився на **сильний біль у грудях** та втратив свідомість. Пульс не визначається, тони серця відсутні. ЕКГ: синусовий ритм, QS та підйом сегмента ST в V1–V4. Реанімаційні заходи неефективні. **При пункції виявлена кров в порожнині перикарда**. Вкажіть найбільш імовірне ускладнення:

- А.Порушення цілісності стінки лівого шлуночка**
- В.Тромбоемболія легеневої артерії
- С.Гостра мітральна недостатність
- Д.Гострий перикардит
- Е.Порушення цілісності міжшлуночкової перегородки

Тест 6.1

Чоловік 52-х років надійшов до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на раптову задишку та прискорене серцебиття. Протягом місяця лікувався у стаціонарі з приводу септичного шоку, що розвинувся після інфекції сечовивідних шляхів. При фізикальному обстеженні АТ – 100/60 мм рт. ст., пульс – 128/хв., частота дихання – 28/хв. SpO₂ – 89 %. При лабораторному дослідженні в сироватці крові креатинін – 96 мкмоль/л, тропонін 1–1,0 нг/мл (норма <0,1 нг/мл). На рентгенограмі органів грудної порожнини незначний гідроторакс праворуч та субсегментарний ателектаз. На ЕКГ: синусова тахікардія, блокада правої ніжки пучка Гіса та інверсія зубців Т у відведеннях III та VI. **Який перший крок у веденні пацієнта буде найбільш доречним?**

Тест 6.2

Чоловік 52-х років надійшов до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на **раптову задишку** та прискорене серцебиття. Протягом місяця **лікувався** у стаціонарі **з приводу септичного шоку**, що розвинувся після інфекції сечовивідних шляхів. При фізикальному обстеженні АТ – 100/60 мм рт. ст., пульс – 128/хв., **частота дихання – 28/хв. SpO2 – 89 %**. При лабораторному дослідженні в сироватці крові креатинін – 96 мкмоль/л, тропонін 1–1,0 нг/мл (норма <0,1 нг/мл). На рентгенограмі органів грудної порожнини незначний **гідроторакс праворуч та субсегментарний ателектаз**. На ЕКГ: синусова тахікардія, блокада правої ніжки пучка Гіса та інверсія зубців Т у відведеннях III та VI. **Який перший крок у веденні пацієнта буде найбільш доречним?**

- А. КТ-ангіографія
- В. Невідкладна катетеризація серця
- С. Компресійна ультрасонографія вен
- Д. Призначення аспіріну та внутрішньовенне введення метопрололу
- Е. Ехокардіографія

Тест 6.3

Чоловік 52-х років надійшов до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на **раптову задишку** та прискорене серцебиття. Протягом місяця **лікувався** у стаціонарі **з приводу септичного шоку**, що розвинувся після інфекції сечовивідних шляхів. При фізикальному обстеженні АТ – 100/60 мм рт. ст., пульс – 128/хв., **частота дихання – 28/хв. SpO2 – 89 %**. При лабораторному дослідженні в сироватці крові креатинін – 96 мкмоль/л, тропонін 1–1,0 нг/мл (норма <0,1 нг/мл). На рентгенограмі органів грудної порожнини незначний **гідроторакс праворуч та субсегментарний ателектаз**. На ЕКГ: синусова тахікардія, блокада правої ніжки пучка Гіса та інверсія зубців Т у відведеннях III та VI. **Який перший крок у веденні пацієнта буде найбільш доречним?**

A. КТ-ангіографія

B. Невідкладна катетеризація серця

C. Компресійна ультрасонографія вен

D. Призначення аспірину та внутрішньовенне введення метопрололу

E. Ехокардіографія

Тест 7.1

У пацієнта віком 35 років виник напад під час якого з'явилися серцебиття, озноб і страх смерті. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри та підвищення АТ. Напад закінчився виділенням великої кількості сечі. **Який патологічний стан виник у пацієнта?**

Тест 7.2

У пацієнта віком 35 років виник **напад** під час якого з'явилися **серцебиття, озноб і страх смерті**. Об'єктивно спостерігається: **блідість шкіри та підвищення АТ. Напад закінчився виділенням великої кількості сечі**. Який патологічний стан виник у пацієнта?

А.Симпато-адреналовий криз

В.Гіперглікемічна кома

С.Тиреотоксичний криз

Д.Колапс

Е.Епілептичний напад

Тест 7.3

У пацієнта віком 35 років виник **напад** під час якого з'явилися **серцебиття, озноб і страх смерті**. Об'єктивно спостерігається: **блідість шкіри та підвищення АТ. Напад закінчився виділенням великої кількості сечі**. Який патологічний стан виник у пацієнта?

А.Симпато-адреналовий криз

В.Гіперглікемічна кома

С.Тиреотоксичний криз

Д.Колапс

Е.Епілептичний напад